

Samtykke til Botox behandling

1. Anvendelse og indikationer for Botulinumtoksin som jeg vil blive behandlet med, er blevet forklaret af min konsulerende læge, og jeg har haft muligheden for at få alle spørgsmål besvaret til min tilfredshed. Jeg er blevet specifikt informeret om følgende: efter behandlingen kan der forekomme nogle almindelige injektionsrelaterede reaktioner. Disse reaktioner inkluderer rødme, havelse, smerte, kløe, blå mærker og ømhed på behandlingsstedet. Disse reaktioner beskrives generelt som milde til moderate og forsvinder typisk spontant et par dage efter behandling. Disse reaktioner er normale og kan forventes. Jeg er informeret om at resultat kan variere og derfor usikkerhed i forhold til om resultat vil matche forventninger.
2. Til injektioner med muskelafslapning med Botulinumtoksin Type A. Jeg er blevet rådgivet af min konsulerende læge om de forventede resultater og risici forbundet med denne behandling baseret på det nuværende produkt. Resumé af produktets egenskaber. Vi har især diskuteret realistiske resultater med hensyn til virkningens begyndelse og virkningens varighed sammen med de potentielle bivirkninger inklusive dem, der vedrører injektionsstedet og den generelle almindelige og ikke almindelige bivirkning, herunder hovedpine, muskelaktivitetsforstyrrelse (hævede øjenbryn), følelse af tyngde i den øverste del af ansigtet, ophobning af væske i øjenlågene (øjenlågsødem), faldende øjenlåg (øjenlågs ptose), betændelse i øjenlåget, øjensmerter, sløret syn, lyde i ørene (tinnitus), kvalme, svimmelhed, muskeltræknings, muskelkramper, lokal muskelsvaghed i ansigtet (faldende øjenbryn), mundtørhed, influenzasymptomer, influenza, bronkitis, betændelse i næse og hals, infektion og i sjældne tilfælde overdreven muskelsvaghed og vanskeligheder ved indtagelse af mad. I tilfælde af en uønsket hændelse har min konsulerende læge rådet mig til at søge lægehjælp med det samme.
3. Jeg har fået og har forstået de efterbehandlingsråd, som min konsulerende læge har givet mig, og forstår, at der kan opstå komplikationer, hvis disse råd ikke overholdes nøje.
4. Her på klinikken overholder vi højeste anbefalet dosis i forskellige områder. Hvis der ikke er forventet effekt efter behandling, giver vi højst 25-30% af maksimum anbefalet dosis ved touch up (inden for 2-4 uger). Vi tilbyder kun enkelte touch up behandling efter hver Botulinumtoksin behandlingen.
5. Jeg har modtaget skriftlig og mundtlig information og haft minimum 48 timers betænkningstid efter den mundtligt givne information.
6. De oplysninger, jeg har givet, er efter min bedste viden korrekte. Jeg har ikke bevidst tilbageholdt nogen medicinsk eller kirurgisk information. Jeg accepterer at jeg har læst ovenstående oplysninger fuldt ud og forstår de mulige komplikationer, der kan opstå. Jeg har drøftet disse med lægen og accepterer behandlingen.

Underskrift

Dato